

# ロタウイルスワクチン予防接種のご案内

令和3年度

令和2年10月1日から「定期接種」になりました。




## 1 対象年齢・標準的な接種方法（出生日の翌日を1日とする）

ロタウイルス感染症を予防し、重症化を防ぐための予防接種です。  
ロタリックスまたはロタテックのどちらか一方を接種します。

《ロタリックス》対象年齢：出生6週0日から24週0日まで

### ●標準的な接種方法

※1回目は、出生14週6日まで（生後2か月以降早めに接種）



《ロタテック》対象年齢：出生6週0日から32週0日まで

### ●標準的な接種方法

※1回目は、出生14週6日まで（生後2か月以降早めに接種）



## 2 ワクチンを接種した後の注意点

- どちらのワクチンも、**接種後（特に1～2週間）は腸重積症（★）の症状に注意し**、症状がある場合はすぐに接種した医療機関を受診しましょう。（やむを得ず、他の医療機関を受診する場合は、母子健康手帳を持参し、必ずロタワクチンを接種したことを医師などに伝えてください。）
- ワクチン接種後2週間ほどは、赤ちゃんの便の中に、ワクチンのウイルスが含まれていることがあります。おむつ交換の後など、ていねいに手を洗ってください。高熱、けいれんなど異常がおきた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

### 【★腸重積症について】

#### (1)腸重積症とは


腸重積症とは、腸管に腸管が入り込み、腸がつまった状態になることです。

接種と関係なく、生後4～5か月頃から月齢が上がるにつれておこりやすくなる病気ですので、早めにワクチン接種を開始し、完了しましょう。

#### (2)ワクチン接種後に観察すること

ワクチン接種後1～2週間程度、腸重積にかかりやすくなると報告されています。

以下のような症状が1つでも見られた場合は、すぐに医療機関を受診してください。



- 泣いたり不機嫌になったりを繰り返す
- 突然はげしく泣く
- 何度も繰り返し吐く
- ぐったりして顔色が悪くなる
- 血が混じった便が出る

**接種の方法や医療機関については裏面をご確認ください！**

# ロタウイルスワクチン予防接種Q&A

**Q ロタウイルスによる胃腸炎はどのようなものですか？**

A ロタウイルスによって引き起こされる急性の胃腸炎で、乳幼児期(0～6歳ころ)にかかりやすい病気です。感染力が強く、乳幼児が感染した場合、脱水症状がひどくなると点滴や入院が必要になることがあります。

**Q ロタリックスとロタテックはどう違うのですか？**

A それぞれ1種類、5種類の弱毒化したロタウイルスがワクチンに含まれています。どちらのワクチンを接種しても同様の効果があります。

**Q ロタリックスを1回接種しましたが、2回目以降、ロタテックを接種できますか？**

A 同じワクチンを続けて接種することになっています。

**Q ロタウイルスワクチンの接種を受ける前後の授乳は避けたほうがいいですか？**

A 接種前後に授乳制限はありませんが、次の進め方がおすすめされています。  
 接種前→接種を受ける1～2時間前までに済ませる(少し空腹感のある方が接種を受けやすい)。  
 接種後→接種後30分程の間隔をあけてから授乳をする(授乳後は嘔吐をする可能性がある)。

## <医療機関での接種のしかた>



**1 医療機関に予約する…ワクチンの種類、希望日などを伝えてください。**

・赤ちゃん訪問などで配布された「予防接種とこどもの健康」をよく読みましょう。

**2 接種当日**

(1) 持ち物・・・①母子健康手帳      ②予診票(全て記入)      ③健康保険証

(2) 費用・・・自己負担なし

・当日、体調が悪い場合は、無理せず予約を変更しましょう。

※ 接種後、体調が悪くなった場合には接種した医療機関にすぐ連絡しましょう。

**【実施医療機関一覧】**

令和3年4月1日現在

	医療機関名	電話番号		医療機関名	電話番号
富岡市	青葉クリニック	62-0822	甘楽町	安藤医院	74-7717
	小泉医院	62-0039		小幡医院	74-2018
	田村医院	64-2065		原医院	74-5656
	宮崎医院	60-1919		もみの木こどもクリニック	67-1040

※ 上記医療機関以外での接種を希望する場合は、早めに保健センターにご相談ください。

**問い合わせ・相談**

富岡市保健センター (電話 64-1901 Fax.64-1969)