

ヤマビル

妙義山のヤマビルシーズンが始まっています。

イヤですよね、ヤマビル。イヤだからこそ知りましょ。あいつらは一体何なんだ!! まじで!!!

ヤマビル mountain leech

← 2~5cm →



ヒルは体の前後に吸盤があって、吸い付きながら体を伸縮させて歩くよ
これを**ほぶく運動**というよ!

分類学的にはミミズやゴカイの仲間の**環形動物**。目も鼻も耳もないので彼らが頼れるのは**触覚**のみ。日本にいるヒルの中では**唯一の陸生**。湿気の多いところが好きなので落ち葉の下とかにひそんでいる。冬も落ち葉の下や土の中にいるので冬の間には落ち葉をうじけておくとかヤマビル対策になるよ!



こんな逆Y字型のあごがある。一つのあごには**70~80**のこまかい菌が並んでいて、吸血するときはこの菌で皮を切り、染み出てきた血を吸い取り、というかんじです。



ヒルにかまれるとそのあとしばらく**血**が止まりません。そして翌日からめっちゃ**痒カユ!** WHY?!

それは **ヒルジン** のせい。


ヤマビルは皮を吸い切りと同時にヒルジンを出します。ヒルジンの**交刺果**でヒルは痛みを感じません。また、血を固めない**交刺果**もあるのでヤマビルは**1時間**ほどかけてのんびり血を吸い、**満腹**になると落ちます。

そのあとも残ったヒルジンのせいで血は流れ売れ、気付いた時には服は**血だらけ**。あとから**カユカユ**。4ヶ月ほどヤマビルにかまれたら、まずは**すぐに血を洗い出し**て、可能なら患部を洗いましょ。

ヤマビル豆知識

ヤマビルは皮がめっちゃ強い。足で踏んでも全然死なない。クリップで両側はむんで子供2人で引いても切れないよ... コワイ...


ヤマビル対策してお山に入らうね!
血ホシイ! 血ホシイ!!



何に反応して寄ってくる?

- ① 呼吸 (CO₂)
- ② 体温
- ③ 振動

半径 2m 以内は感知できるとか... オノロシ...



複合的に感知してるよ。

とにかく肌を出さないこと!!

ヒルよけスプレーは特に足元を念入りに!
ヒルよけ

(長ズボンの場合はすそをくつしたの中に入れてね!)

血を吸ったヤマビルは**1か月**後に産卵します。← 40~80個の卵 その1か月後には**ふ化**します。だから血を吸ったヒルはできるだけ**退治**しましょ。

ヤマビルに吸血されたら

- ① **すぐ**取ろ!! (吸盤ごとくっついてるだけなのを引っぱると取れる。ちなみ(に)手の平の皮はかたすぎて吸血できないからご安心を。)
- ② ヤマビルを殺す (塩をかける、アルコールをかける、火焼く、切る、ヒルスプレーをかけるなど)
- ③ 患部をつまんでできるだけ血を押し出し、可能なら洗う
- ④ **ばんそうこう**を貼る (抗ヒスタミン剤などの軟こうなど塗っておくと尚よし)

ヤマビルは土色面から上がってきます。昔は「上から落ちてくる」と言われたものですが、『子どもヤマビル研究会』← webで検索!! の子どもたちが定説をくつがえす実証実験結果を出しました。ヒルは木から落ちてこない!!
というわけが入山時、少なくとも足回りだけは入念に対策を!!